


Gusanos verdes

Helicoverpa armigera (Hübner 1808)

[Lepidoptera: Noctuidae]



Descripción

Las larvas de este lepidóptero son muy voraces, pudiendo producir graves daños en poco tiempo. La hembra realiza la puesta de huevos de forma aislada lo que facilita que una pequeña población pueda afectar varias parcelas de cultivo. Los primeros estadios larvarios se localizan sobre flores y hojas, de las que se alimentan; al final de su desarrollo llegan a alcanzar una longitud de 30 a 35 mm. Su coloración general es amarillo-verdosa y presenta una línea lateral blanca y otra línea dorso lateral negra con puntos negros, rojos o naranjas. La línea mediana dorsal es verde oscura.

Síntomas y daños directos

- Cuando la planta es pequeña puede verse afectada la yema apical del tallo.
- Se alimenta de los frutos en donde se introducen, causando daños importantes.
- Debilitamiento generalizado de la planta al alimentarse de las hojas y brotes.


Daños indirectos

- Los tejidos dañados, restos de comida y heces del gusano facilitan la entrada de organismos patógenos causantes de podredumbres.

Control preventivo y técnicas culturales

- Eliminar las malas hierbas.
- Colocar trampas con feromonas para conocer el vuelo de los adultos.

Gusanos verdes *Heliothis armigera* [Lepidoptera: Noctuidae]



Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales de la Universidad de León

